©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

Zoologische Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und dem Peloponnes

Von

Max Beier (Wien)

IX. Teil

Araneae und Opiliones

(Vorgelegt in der Sitzung am 20. Februar 1930)

Araneae.

Bearbeitet von Eduard Reimoser, Wien.

Die Sammelausbeute des Herrn Dr. Max Beier von den Jonischen Inseln gibt ein wertvolles Material zur Bereicherung unserer Kenntnisse über die Verbreitung der Spinnen. Die Zahl der bisher von den Jonischen Inseln bekannten Arten (41) steigert sich dadurch auf 109. Von Korfu waren 40, von Levkas 0, von Kephalonia 2 Arten und von Zante nur 1 Art bekannt. Nach Hinzurechnung der von Herrn Beier gefundenen Formen kennt man nun von Korfu 69, von Levkas 28, von Kephalonia 46 Arten und von Zante 1 Art. Ob die bisher nur auf Korfu gefundenen 8 Arten endemisch sind, ist kaum anzunehmen, da ja ähnliche Verhältnisse wie in Dalmatien vorliegen, wo die Inselformen auch am Festlande vorkommen. Bei weiteren 11 Arten ist das Vorkommen auf die Balkanhalbinsel beschränkt. 43 Arten wurden an anderen Stellen des Mittelmeergebietes gefunden und die restlichen 45 Arten zeigen eine weitere Verbreitung, sind zum Teil auch außerhalb der paläarktischen Region heimisch, 2 davon sind Kosmopoliten.

Nachfolgend das Verzeichnis der von Herrn Beier 1929 gesammelten Spinnen.

Fam. **Ctenizidae.**

Nemesia caementaria (Latr.). — 4 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Fam. **Dipluridae.**

Macrothele icterica (C. L. Koch). — 1 ♀ von der Lagune auf Levkas; neu für Levkas.

Fam. **Dysderidae.**

Dysdera crocota C. L. Koch. — 1 ♀ vom Hagjos Mathias, 2 ♀ vom Aenos, 1 ♂ von der Strandzone in Levkas; neu für Korfu, Kephalonia und Levkas.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

Dysdera ninnii Can. — 1 ♀ von Potamos, 1 ♀ von Gasturi, 1 ♂ vom Megan Oros. 1 ♀ von Sivros, 1 ♀ vom Stavrotas, 1 ♂ von der Voidia; neu für Korfu und Levkas.

Dysdera punctata C. L. Koch. — 1 ♀ von Korfu.

Harpactes amoenus Kulcz. — 1 ♀ aus der Höhle Polus Tripas; neu für Levkas.

Fam. **Filistatidae.**

Filistata insidiatrix (Forsk.) — 1 ♀ von Argostoli, 1 ♀ von Sivros; neu für Kephalonia und Levkas.

Fam. **Sicariidae.**

Loxosceles rufescens (Duf.). — 1 ♀ von Krane; neu für Kephalonia.

Scytodes thoracica (Latr.). — Je 1 ♀ von der Standzone und vom Olivenhain auf Levkas; neu für Levkas.

Fam. **Gnaphosidae.**

Drassodes lapidosus (Walck.). — 2 ♀ vom Stavrotas, 1 ♂ und 1 ♀ vom Megan Oros, 3 ♀ von der Voidia; neu für Levkas.

Drassodes silvestris (Blackw.). — 1 ♀ von Sivros; neu für Levkas.

Gnaphosa lucifuga (Walck.). — 1 ♀ von Krane, 3 ♀ von der Voidia; neu für Kephalonia.

Pterotricha exornata (C. L. Koch). — 1 ♀ vom Aenos; neu für Kephalonia.

Fam. **Clubionidae.**

Chiracanthium pelasgicum (C. L. Koch). — 1 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Fam. **Thomisidae.**

Thomisus albus Gmelin. — 3 ♂ und 1 ♀ von Krane; neu für Kephalonia.

Runcinia lateralis C. L. Koch. — 29 ♀ von Krane, 2 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Synaema globosum (F.). — 2 ♀ von Krane, 1 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Oxyptila brevipes (Hahn). — 1 ♀ von Korfu (Lagune); neu für Korfu.

Oxyptila blackwalli Sim. — 3 ♀ vom Hagjos Mathias.

Heriaeus savignyi Sim. — 1 ♀ vom Megan Oros; neu für Levkas.

Philodromus aureolus (Olv.). — 2 ♂ und 4 ♀ von Krane.

Thanatus formicinus (Oliv.). — 1 ♀ vom Aenos; neu für Kephalonia.

Tibellus oblongus (Walck.). — 3 ♀ von Krane, 1 ♂ von Kaligoni; neu für Levkas.

Fam. **Sparassidae.**

Eusparassus argelasius (Latr.). — 1 ♀ von Argostoli.

Fam. **Palpimanidae.**

Palpimanus gibbulus Duf. — 4 ♀ von Krane, 1 ♀ von der Voidia, 1 ♀ von Eglikas.

Fam. **Eresidae.**

Eresus walckenaeri Brullé. — 1 ♀ von Argostoli; neu für Kephalonia.

Fam. **Pisauridae.**

Pisaura listeri (Scop.). — 2 ♀ von Korfu (Lagune), 1 ♂ von Sivros; neu für Levkas.

Fam. **Lycosidae.**

Hogna praegrandis (C. L. Koch). — 1 ♀ von Argostoli, 1 ♀ vom Aenos, 1 ♀ vom Stavrotas, 1 ♀ vom Megan Oros, 4 ♀ von der Voidia, 1 ♀ von Purnaro-Kastron; neu für Levkas.

Arctosa perita (Latr.). — 2 ♀ vom Stavrotas, 1 ♀ vom Megan Oros; neu für Levkas.

Tarentula albofasciata (Brullé). — 1 ♀ von Frini; neu für Levkas.

Pirata piscatorius (Clerck). — 1 ♀ von Sivros, 1 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Lycosa atomaria C. L. Koch. — 2 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Lycosa cursoria C. L. Koch. — 1 ♀ von Krane; neu für Kephalonia.

Fam. **Oxyopidae.**

Oxyopes lineatus Latr. — 1 ♀ von Krane, 1 ♀ von Kaligoni; neu für Kephalonia und Levkas.

Fam. **Zoropsidae.**

Zoropsis spinimana (Duf.). — 1 ♀ vom Hagjos Mathias; neu für Korfu.

Fam. **Salticidae.**

Heliophanus kochi Sim. — 1 ♀ von Krane, 1 ♂ von Purnaro-Kastron; neu für Kephalonia.

Phlegra bresnieri (Luc.). — 1 ♀ vom Aenos, 1 ♀ von Enkluvi, 1 ♂ von der Strandzone auf Levkas; neu für Levkas und Kephalonia.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

Philaeus chrysops (Poda). — 1 ♂ von Krane, 2 ♀ von Argostoli, 1 ♂ von der Voidia.

Fam. **Agelenidae.**

Textrix vestita C. L. Koch. — 1 ♀ von Potamos, 2 ♀ von Argostoli, 2 ♂ und 2 ♀ vom Megan Oros, 1 ♂ und 1 ♀ von der Voidia; neu für Korfu und Levkas.

Agelena similis Keys. — 1 ♀ von Krane; neu für Kephalonia.

Agelena labyrinthica (L.) — 1 ♀ von Krane, 1 ♀ vom Rudi; neu für Kephalonia.

Tegenaria parietina (Fourcr.). — 1 ♀ von Enkluvi; neu für Levkas.

Tegenaria ferruginea (Panz.) — 1 ♀ vom Pantokrator; neu für Korfu.

Fam. **Pholcidae.**

Pholcus phalangioides (Fueßl). — 1 ♀ von Sivros; neu für Levkas.

Holocnemus pluchi (Scop.). — 3 ♀ von Enkluvi, 2 ♀ von Krane, 1 ♀ vom Pantokrator; neu für Korfu, Kephalonia und Levkas.

Fam. **Theridiidae.**

Lithyphantes paykullianus (Walck.). — 1 ♀ vom Hagjos Mathias, 2 ♀ von Sivros; neu für Korfu und Levkas.

Fam. **Argiopidae.**

Pachygnatha clercki Sund. — 2 ♂ und 1 ♀ von Kaligoni; neu für Levkas.

Aranea angulata L. — 1 ♀ vom Aenos, 1 ♀ vom Rudi, 1 ♀ von der Voidia; neu für Kephalonia.

Aranea foliata Fourcr. — 1 ♂, 3 ♀ von Krane;

Aranea adianta (Walck.). — 5 ♂, 14 ♀ von Krane.

Aranea redii Scop. — 2 ♀ von Krane.

Ferner lag mir noch die Ausbeute Dr. Beier's vom Jahre 1926 vor, die folgende Arten enthielt:

Dysdera punctata C. L. Koch. — Korfu.

Scythodes thoracica Latr. — Korfu und Aenos, Kephalonia.

Drassodes lapidosus Walk. — Kephalonia (Aenos und Argostoli).

Liocranum rutilans Thor. — Aenos, Kephalonia.

Anyphaena sabina L. Koch. — Korfu, Hagjos Mathias.

Tmarus piger Walk. — Argostoli, Kephalonia.

Thomisus albus Gmelin. — Korfu und Argostoli.

Runcinia lateralis C. L. Koch. — Argostoli.

Synaema globosum F. — Korfu, Hagjos Mathias und Kephalonia (Aenos, Argostoli).

Oxyptila blackwalli Sim. — Korfu, Hagjos Mathias.

Philodromius aureolus Oliv. — Korfu, Hagjos Mathias und Argostoli.

Tibellus oblongus Walk. — Korfu und Argostoli, Kephalonia.

Eusparassus argelasius Latr. — Argostoli, Kephalonia.

Micrommata viridissima Deg. — Korfu.

Palpimanus gibbulus Duf. — Korfu und Argostoli, Kephalonia.

Zodarium elagans Sim. — Korfu.

Eresus walckenaeri Brullé. — Kephalonia, Aenos und Argostoli.

Pisaura listeri Scop. — Korfu und Kephalonia (Argostoli).

Hogna praegrandis C. L. Koch. — Argostoli, Kephalonia.

Hogna vultuosa C. L. Koch. — Aenos, Kephalonia.

Arctosa variana C. L. Koch. — Korfu.

Trochosa terricola Thor. — Korfu und Kephalonia (Aenos).

Tarentula albofasciata Brullé. — Korfu (Hagjos Mathias) und Kephalonia (Argostoli).

Synageles dalmaticus Keys. — Argostoli.

Heliophanus cambridgei Sim. — Argostoli.

Dendryphantes nidicolens Walck. — Argostoli.

Phlegra bresnieri Luc. — Korfu.

Philaeus chrysops Poda. — Argostoli.

Evarcha jucunda Luc. — Korfu.

Textrix vestita C. L. Koch. — Kephalonia, Argostoli und Aenos.

Amaurobius erberi Keys. — Korfu (Hagjos Mathias) und Kephalonia (Aenos).

Theridium vittatum C. L. Koch. — Korfu, Hagjos Mathias.

Lithyphantes paykullianus Walck. — Argostoli.

Cyclosa conica Pallas. — Korfu, Hagjos Mathias.

Mangora acalypha Walck. — Korfu.

Aranea dromedaria Walck. — Korfu (Hagjos Mathias) und Kephalonia (Argostoli, Aenos).

Aranea diodia Walck. — Korfu, Hagjos Mathias.

Aranea foliata Fourcr. — Argostoli.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

Aranea adianta Walck. — Kephalonia (Argostoli und Aenos).
Aranea redii Scop. — Argostoli.
Aranea (Zilla) keyserlingi Auss. — Argostoli.

Es folgt nun das tabellarische Verzeichnis der Spinnen, deren Vorkommen auf den Jonischen Inseln bis jetzt festgestellt wurde.

	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Fam. **Ctenizidae.**					
Cyrtocarenum grajum (C. L. Koch)	+				Korfu, Nauplia.
Cyrtocarenum hellenum Auss.....	+				Korfu.
Cyrtocarenum jonicum (Saund.)..	+			+	Korfu, Zante.
Nemesia caementaria (Latr.).....		+			Südeuropa.
Fam. **Dipluridae.**					
Brachythele icterica (C. L. Koch)..		+			Dalmatien, Naupl.
Fam. **Dysderidae.**					
Dysdera crocota C. L. Koch.....	+	+	+		Mediterran.
Dysdera ninnii Can.....	+	+			Südeuropa.
Dysdera punctata C. L. Koch	+				Südeuropa, Ost.
Harpactes amoenus Kulcz.....		+			Crkvenica.
Segestria florentina (Rossi).....	+				Mediterran.
Ariadna spinipes (Luc.)	+				Mediterran.
Fam. **Filistatidae.**					
Filistata insidiatrix (Forsk.)		+	+		Mediterran.
Fam. **Oecobiidae.**					
Oecobius jonicus (Cambr.) .	+				Korfu.
Fam. **Urocteidae.**					
Uroctea durandi (Walck.)... ..	+				Mediterran.
Fam. **Sicariidae.**					
Loxosceles rufescens (Duf.).....			+		Mediterran, Japan, Amerika.
Scytodes thoracica (Latr.).....	+	+	+		Europa, Mediterran, Nordamerika.

	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Fam. **Gnaphosidae.**					
Drassodes lapidosus (Walck.) ..	+	+	+		Europa, Mediterran, China.
Drassodes silvestris (Blackw.) ...		+			Europa.
Gnaphosa lucifuga (Walck.) ...			+		Europa.
Pterotricha exornata (C. L. Koch)..			+		Mediterran.
Pterotricha corcyrea (Cambr.) ..	+				Korfu.
Fam. **Clubionidae.**					
Chiracanthium pelasgicum (C. L. Koch)		+			Mediterran.
Liocranum ochraceum L. Koch...	+				Korfu.
Liocranum rutilans (Thor.)			+		Mitteleuropa, Oberitalien.
Anyphaena sabina L. Koch	+				Südeuropa.
Fam. **Thomisidae.**					
Tmarus piger Walck.....			+		Mittel- u. Südeuropa, Japan.
Thomisus albus Gmelin.....	+		+		Mitteleuropa, Medit., Nordasien, Japan.
Runcinia lateralis C. L. Koch....		+	+		Mediterran.
Synaema globosum (F.) ..	+	+	+		Mitteleuropa, Medit., Zentralasien, Sibir.
Oxyptila brevipes (Hahn) ..	+				Europa.
Oxyptila blackwalli Sim. ..	+				Mittel- u. Südeuropa.
Heriaeus savignyi Sim..... ..		+			Mediterran, Österr.
Philodromus torquatus Cambr. ..	+				Korfu.
Philodromus aureolus (Oliv.). ...	+		+		Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika.
Thanatus formicinus (Oliv.).. ..			+		Europa, Mediterran, Nordamerika.
Tibellus oblongus (Walck.) ..	+	+	+		Palaearkt.
Fam. **Sparassidae.**					
Eusparassus argelasius (Latr.). ..			+		Mediterran.
Micrommata viridissima (Deg.). .	+				Palaearkt.
Fam. **Palpimanidae.**					
Palpimanus gibbulus Duf.. .	+		+		Mediterran.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Fam. **Zodariidae.**					
Zodarium elegans Sim. ..	+				Südeuropa.
Fam. **Eresidae.**					
Eresus walckenaeri Brullé.. ...			+		Mediterran Osten.
Fam. **Pisauridae.**					
Pisaura listeri (Scop.) ...	+	+	+		Europa. Mediterran.
Fam. **Lycosidae.**					
Hogna praegrandis (C. L. Koch)..		+	+		Balkan, Kleinasien.
Hogna vulluosa C. L. Koch			+		Balkan, Südrußland Kleinasien, Syrien
Arctosa variana C. L. Koch	+				Südeuropa.
Arctosa perita (Latr.) ..		+			Europa.
Trochosa terricola Thor...	+		+		Europa, Sibirien.
Tarentula albofassciata (Brullé) ..	+	+	+		Mediterran.
Pirata piscatorius (Clerck) ..		+			Europa.
Lycosa atomaria C. L. Koch.....	+	+			Griechenland, Zypern.
Lycosa cursoria C. L. Koch ...			+		Europa.
Fam. **Oxyopidae.**					
Oxyopes lineatus Latr. ..		+	+		Mediterran.
Oxyopes ramosus (Panz.) ..	+				Europa.
Fam. **Zoropsidae.**					
Zoropsis spinimana (Duf.) .	+				Mediterran.
Fam. **Salticidae.**					
Synageles dalmaticus Keys.. .			+		Mediterran.
Heliophanus simplex Sim. ..	+				Balkan.
Heliophanus cambridgei Sim.... .	+		+		Süd- u. Mitteleuropa.
Heliophanus flavipes Hahn ..	+				Europa, Sibirien.
Heliophanus furcillatus Sim.....	+				Korfu, Sizilien.
Heliophanus kochi Sim... ..			+		Südeuropa.
Saitis graeca Kulcz..... ..	+				Korfu, Patras.
Evophrys difficilis (Sim.)	+				Südeuropa Osten.

	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Evophrys obsoleta (Sim.)	+				Balkan.
Chalcoscirtus infimus (Sim.) ..	+				Mediterran.
Salticus unicolor (Sim.)	+				Korfu.
Salticus mandibularis (Sim.)	+				Korfu.
Salticus olivaceus (Sim.).....	+				Korfu, Tinos, Syra.
Dendryphantes nitelinus (Sim.) ...	+				Südeuropa.
Dendryphantes nidicolens Walck...			+		Mediterran.
Bianor albobimaculatus (Luc.)....	+				Mediterran.
Habrocestum latifasciatum (Sim.)..	+				Korfu, Kreta, Syrien.
Phlegra bresnieri (Luc.)	+	+	+		Mediterran.
Pellenes geniculatus (Sim.)	+				Südeuropa.
Pellenes diagonalis (Sim.).....	+				Korfu, Syra, Syrien.
Pellenes ostrinus (Sim.) .	+				Korfu, Syrien.
Pellenes laevigatus (Sim.).. ..	+				Korfu, Syra.
Neaetha cerussata (Sim.)..... ..	+				Ost-Mediterran.
Philaeus chrysops Poda			+		Mitteleuropa, Medit.
Evarcha jucunda (Luc.) ..	+				Mediterran.
Hasarius adansoni (Aud.) ..			+		Kosmopolit.
Fam. **Agelenidae.**					
Textrix vestita C. L. Koch ..	+	+	+		Balkan.
Agelena similis Keys..... ..			+		Mittel- u. Südeuropa.
Agelena labyrinthica (L.).....			+		Europa, Zentralasien, Japan.
Tegenaria parietina (Fourcr.)....		+			Mitteleuropa, Medit.
Tegenaria ferruginea (Panz.).....	+				Europa.
Fam. **Amaurobiidae.**					
Amaurobius erberi Keys. ..	+		+		Mediterran.
Fam. **Dictynidae.**					
Dictyna latens (F.)	+				Europa, Mediterran.
Fam. **Pholcidae.**					
Pholcus phalangioides (Fueßl.) ...		+			Kosmopolit.
Holocnemus pluchi (Scop.).....		+	+		Mediterran.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Fam. **Linyphiidae.**					
Entelecara graeca (Cambr.) ..	+				Mediterran.
Fam. **Theridiidae.**					
Theridium vittatum C. L. Koch ..	+				Europa, Japan.
Lithyphantes paykulli (Walck.)...	+	+	+		Mediterran.
Fam. **Mimetidae.**					
Mimetus laevigatus (Keys.) ...			+		Südeuropa.
Fam. **Argiopidae.**					
Pachygnatha clercki Sund.....		+			Europa, Sibirien.
Tetragnatha extensa (L.)	+				Palaearkt.
Tetragnatha nitens (Aud.).....			+		Mediterran.
Cyclosa conica (Pallas).....	+				Europa, Amerika.
Mangora acalypha (Walck.) ..	+				Europa, Mediterran.
Aranea angulata L.....			+		Europa, Mediterran. Nordamerika.
Aranea dromedaria Walck.....	+		+		Mitteleuropa, Mediterran.
Aranea diodia Walck. ..	+				Mittel- u. Südeuropa.
Aranea cucurbitina L. ...	+				Europa, Mediterran, Japan.
Aranea foliata Fourcr... ..			+		Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika
Aranea adianta (Walck.) .			+		Europa, Mediterran, Sibirien, Japan.
Aranea redii Scop.			+		Europa, Mediterran, Japan.
Aranea impedita L. Koch ...	+				Korfu.
Aranea semiatra (L. Koch) ..	+				Italien, Griechenland.
Aranea keyserlingi (Auss.) ..			+		Balkan, Frankreich.
Cyrtarachne ixoides (Sim.) ..	+				Dalmatien, Korfu, Korsika, Toskana.
Theridiosoma gemmosum (L. Koch)	+				Mittel- u. Südeuropa, Nordamerika.

Opiliones.

Bearbeitet von C. Fr. Roewer, Bremen.

Subordo **Cyphophthalmi.**

Siro duricorius (Joseph). — Korfu: Gasturi, 2. IV 14 Exemplare und H. Mathias, 6. IV. 1929, 10 Exemplare; Levkas: Kaligoni, 14. IV., 8 Exemplare und Stavrotas, 1100 *m*, 26. IV 1929, 5 Exemplare; neu für die Jonischen Inseln.

Subordo **Palpatores.**

Fam. **Trogulidae.**

Trogulus graecus Dahl. — Korfu, Potamos, 1. IV. 1929. 1 Exemplar.

Trogulus corcyraeus Dahl. — Korfu, 1926, 1 Exemplar.

Trogulus tricarinatus L. — Korfu: Gasturi, 2. IV., 3 Exemplare und H. Mathias, 6. IV. 1929, 4 Exemplare; Kephalonia, 1926, 1 Exemplar.

Dicranolasma opilionoides (L. Koch). — Korfu, Potamos, 1. IV 1929, 3 Exemplare.

Calathocratus africanus Luc. — Korfu, März 1926, 3 Exemplare.

Fam. **Nemastomatidae.**

Nemastoma sp. — Kephalonia, 1926, 1 pull.

Fam. **Phalangiidae.**

Lacinius horridus (Panz.) — Argostoli, Kephalonia, 2 Exemplare und Patras, Pelop., 1 Exemplar.

Metaphalangium propinquum (Luc.) — Argostoli, 9 ad und 10 pull. 1926 und 1 pull. 1929.

Opilio parietinus (Deg.). — Argostoli, 1 pull., Patras, 21. V., 5 Exemplare.

Metadasylobus pristes (L. Koch). — Korfu: Potamos, 1. IV. und Gasturi, 2. IV. 1929; Levkas: Umg. Levkas, 8. bis 30. IV., Frini, 9. IV., Kaligoni, 14. IV., Megan Oros, 16. IV., Höhle Polus Tripas bei Enkluvi, 17. IV., Salinen, 28. IV. 1929; Kephalonia: Argostoli, 8. V., Aenos, 10. V., Rudi, 1000 *m*, 12. V 1929; Peloponnes: Voidia, 1500—1927 *m*, 23. V. 1929.

Metadasylobus instratus (L. Koch). — Korfu: H. Mathias, 1926; Levkas: Megan Oros, 16. IV., Enkluvi, 17. IV.; Kephalonia: 1926.

Platybunus grandissimus C. L. Koch. — Sivros, Levkas, 25. IV. 1929, 11 Exemplare.

Platybunus spec. pull. — Korfu, Lagune und Levkas, Stavrotas.

Nelima religiosa (Sim.). — Pantokrator, Spartilla, 2 Exemplare.

Nelima aurantiaca (Sim.). — Levkas, Höhle Polus Tripas, 17. V. 1929, 1 Exemplar.

©Akademie d. Wissenschaften Wien; download unter www.biologiezentrum.at

Von den Jonischen Inseln sind bis jetzt folgende Arten bekannt:

Art	Korfu	Levkas	Kephalonia	Zante	Verbreitung
Siro duricorius (Jos.)	+	+			Krain, Dalmatien
Trogulus graecus Dahl	+				Korfu
corcyraeus Dahl	+				
tricarinatus L.	+		+		Tot. Europ.
Dicranolasma opilionoides (L. K.)	+				Balkan
Calathocratus africanus Luc.	+				Mediterran, Kaukasus
Nemastoma graecum Rwr.	+				Griechenland
corcyraeum Rwr.	+				Korfu
pull. sp.?			+		
Ischropsalis corcyraeum Rwr.	+				Korfu
Lacinius gallipoliensis Rwr.	+				Balkan
horridus (Panz.)			+		Tot. Europ.
Metaphalangium propinquum (Luc.)			+		Mediterran
Opilio parietinus (Deg.)			+		Palaearct. u. nearct.
Metadasylobus pristes (L. Koch)	+	+	+	+	Griechenland
instratus (L. K.)	+	+	+	+	
Platybunus grandissimus C. L. K.		+			
Nelima religiosa (Sim.)	+				Mediterran
Nelima aurantiaca (Sim.)		+			Mediterran u. alpin